

وبسایت تخصصی آزمون های زبان  
[www.FastZaban.com](http://www.FastZaban.com)

دانلود منابع آزمون های  
MSRT, EPT, MHLE, TOEFL

و دکتری همه رشته ها  
فروش اینترنتی کتاب های تألیفی استاد  
مهرداد زنگیه وندی

### Fast Grammar

توضیح کامل ۶۰ مهارت لاتگمن

به همراه سوالات آزمون های سراسری و آزمون های کتاب **Kit** با  
پاسخ کاملاً تشریحی

### Fast Reading

توضیح نکات و مهارت های درک مطلب آزمون

**Fast Grammar**

# گرامر جامع آزمون های زبان

- تافل دکتری
- آزمون دکتری همه رشته ها
- کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مجموعه زبان انتلیسی

✓ تشریح و توضیح کامل مهارت های ۶۰ گانه کتاب تافل لانگمن  
✓ آزمون های جامع و تست های کتاب Kit با پاسخ تشریحی  
✓ تست های طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی  
✓ تست های کنکور دکتری ۹۳ تا ۱۵ همه رشته ها با پاسخ تشریحی  
✓ شامل بیش از ۶۰۰۰ تست با پاسخ تشریحی




به همراه  
آموزش تکنیک های  
تست زنی

مؤلف: مهرداد زنگیه وندی

**www.FastZaban.com**

**وبسایت تخصصی آزمون های زبان**

126



126B

B

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه  
۱۳۹۴/۱۲/۱۶



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.  
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

## آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمركز) – سال ۱۳۹۵

### علوم ریاضی (کد ۲۲۰۶)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان دروس اختصاصی، تعداد و شماره سوال ها

ردیف	دروس اختصاصی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مبانی آنالیز ریاضی، مبانی آنالیز عددی، مبانی ماتریس ها و جبر خطی	۴۵	۱	۴۵

این آزمون نمره منفی دارد.  
استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) یعنی از برگزاری آزمون، برای تعاملی اشخاص حلبانی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می داشد و با متخلفین برای مقررات رفتار می شود.

مبانی آنالیز ریاضی:

فرض کنید  $f : A \times B \rightarrow \mathbb{R}$  تابعی کراندار باشد. کدام گزینه درست است؟ -۱

$$\sup_y \inf_x f(x, y) \leq \inf_y \sup_x f(x, y) \quad (1)$$

$$\sup_y \inf_x f(x, y) \leq \inf_x \sup_y f(x, y) \quad (2)$$

$$\sup_y \inf_x f(x, y) \geq \inf_x \sup_y f(x, y) \quad (3)$$

$$\sup_x \inf_y f(x, y) \leq \inf_x \sup_y f(x, y) \quad (4)$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^{\gamma}(\pi\sqrt{n^{\gamma} + n})$  مقدار کدام است؟ -۲

-۱ (۱)

۰ (۲)

۱ (۳)

۴ موجود نیست.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\cos^1 \frac{1}{n} \times \cos^{\frac{1}{2}} \frac{1}{n} \times \dots \times \cos^{\frac{1}{n}} \frac{1}{n}}$$

مقدار کدام است؟ -۳

۰ (۱)

 $\frac{1}{2}$  (۲)

۱ (۳)

 $\infty$  (۴)

-۴ اگر  $x_n = \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n}$  درست است؟

و اگر است.  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$  ولی  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$  (۱)

و اگر است.  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$  لذا  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq 0$  (۲)

به مقدار کمتر یا مساوی  $c$  همگراست.  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$  و  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$  (۳)

به مقدار بیشتر از  $e$  همگراست.  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$  و  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$  (۴)

-۵ سری  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\cos n)(\sin(na))}{n}$  به ازای چه مقادیر  $a$  همگراست؟

(۱) فقط وقتی که  $|a| \leq 1$ .

(۲) فقط وقتی که  $a$  مضربی صحیح از  $\frac{\pi}{2}$  باشد.

(۳) فقط وقتی که  $a$  اصم یا صفر باشد.

(۴) تمام مقادیر  $a \in \mathbb{R}$ .

-۶ فرض کنید  $f(ax) = bf(x)$  بر بازه  $[0, 1]$  کران دار باشد و برای  $x \leq \frac{1}{a}$  که  $a, b > 0$  و  $a \neq b$  در رابطه  $a < b$  درست است؟

صدق کند. کدام گزینه در مورد  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  درست است؟

(۱) حد موجود و برابر  $\frac{b}{a}$  است.

(۲) حد موجود و برابر  $f(0)$  است.

(۳) حد موجود و برابر  $\frac{a}{b}$  است.

(۴) ممکن است حد موجود نباشد.

-۷ در مورد تابع  $f(x) = [x] + (x - [x])^{[x]}$  کدام گزینه درست است؟

(۱) تابع  $f$  بر  $(0, +\infty)$  اکیداً صعودی است.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - [x]) = 0 \quad (۲)$$

(۳) تابع  $f$  بر  $(0, +\infty)$  پیوسته یکنواخت است.

(۴) تابع  $f$  بر  $(0, +\infty)$  پیوسته است ولی پیوسته یکنواخت نیست.

-۸ فرض کنید  $I$  یک بازه و  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ . کدام گزینه نتیجه می‌دهد؟  $f$  پیوسته یکنواخت است.

(۱)  $f$  کران دار، پیوسته و یکنواخت است.

(۲)  $f$  پیوسته و  $f \circ f$  پیوسته یکنواخت است.

(۳)  $f$  یک به یک و تصویر وارون هر دنباله کوشی، کوشی است.

(۴) به ازای هر  $n \in \mathbb{N}$ ، تابع  $g_n(x) = x^n f(x)$  پیوسته یکنواخت است.

-۹ فرض کنید  $I$  یک بازه کران دار و  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  پیوسته یکنواخت باشد، در این صورت همه گزینه های زیر، صحیح اند.

به غیر از:

(۱)  $f(I)$  کران دار است.

(۲) اگر  $f$  یک به یک باشد، تصویر وارون هر دنباله کوشی، کوشی است.

(۳) اگر  $f$  اکیداً یکنوا باشد دارای وارون پیوسته یکنواخت است.

(۴) چند جمله ای  $p$  وجود دارد که  $p \circ f$  پیوسته یکنواخت نیست.

-۱۰ فرض کنید  $D$  زیرمجموعه باز  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ،  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  صعودی باشد. کدام گزینه معادل پیوستگی  $f$  نیست؟

(۱) برای هر  $a \in D$   $\inf\{f(y) - f(x) : x, y \in D, x < a < y\} = 0$ .

(۲) برای هر زیرمجموعه کران دار  $A$  از  $D$  و  $\inf(f(A)) = f(\inf A)$ .

(۳) دارای وارون پیوسته باشد.

(۴) برای هر  $a \in D$ ، دنباله  $\{x_n\}$  در  $D$  وجود دارد که  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$  و  $\{x_n\}$  نامتناهی باشد.

-۱۱ فرض کنید  $a < b$  و تابع  $f$  بر بازه  $[a, b]$  پیوسته و بر بازه  $(a, b)$  مشتق پذیر باشد. در این صورت عددی مانند  $c$

در بازه  $(a, b)$  یافت می شود به طوری که مقدار  $\frac{bf(a) - af(b)}{b - a}$  برابر است با:

$f(c)$  (۱)

$f'(c)$  (۲)

$f(c) - cf'(c)$  (۳)

$cf'(c) - f(c)$  (۴)

-۱۲ فرض کنید  $f$  بر  $(0, \infty)$  مشتق پذیر باشد و  $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 1$  در این صورت:

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$  (۱)

$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x + 1) - f(x)) = 1$  (۲)

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$  (۳)

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{1}{h}$  ،  $h \in (0, 1)$  (۴)

- ۱۳- فرض کنید  $f$  تابعی اکیداً صعودی و دوبار مشتق پذیر بر بازه  $(0, +\infty)$  باشد و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - f''(x)) = L$ . کدام

گزینه درست است؟

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - f'(x)) = 0 \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - f'(x)) = L \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{f(x)} = 1 \quad (3)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + f'(x)) = +\infty \quad (4)$$

- ۱۴- فرض کنید  $f(x)$  بر  $\mathbb{R}$  پیوسته باشد و برای  $n = 0, 1, 2, \dots$  قرار دهیم  $a_n = \int_0^1 f(n+x) dx$  بهطوری که

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(nx) dx \text{ کدام است؟} \quad \text{در این صورت مقدار } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

۰ (۱)

$f(a)$  (۲)

$a$  (۳)

۴) ممکن است موجود نباشد.

- ۱۵- فرض کنید تابع  $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  پیوسته باشد. اگر  $k > 1$  موجود باشد که برای هر

$$|g(x)| \leq k \int_a^x |g(t)| dt \text{ در این صورت همه گزینه های زیر صحیح اند، به غیر از:}$$

$$\int_a^b |g(x)| dx = k \quad (1)$$

۲) تابع  $g$  بر  $[a, b]$  مشتق پذیر است.

$$\int_a^b g(x) dx = k(g(b) - g(a)) \quad (3)$$

$$|g(x)| = k \int_a^x |g(t)| dt, x \in [a, b] \quad (4)$$

مبانی آنالیز عددی:

- ۱۶- می دانیم که  $x$  عددی نزدیک صفر است و  $x^p \cos x - x \sin x + \frac{1}{3} \ln(1+x^3) = O(x^p)$ . عدد  $p$  کدام است؟

۴ (۱)

۵ (۲)

۶ (۳)

۷ (۴)

- ۱۷ در یک دستگاه ممیز شناور نرمال شده در مبنای ۲، هر عدد حقیقی به صورت  $d_1 \times 2^{\pm d_3 d_4}$  با  $d_i$  ارقام در مبنای ۲ و  $d_1 \neq 0$  (وقتی عدد مخالف صفر باشد)، ذخیره می شود. فرض کنید در این دستگاه ارقام غیرقابل نمایش بریده می شوند. کوچک ترین عدد قابل نمایش و روند عدد یک به ترتیب برابرند با .... .

(۱)  $2^{-4} \times 2^{-5}$

(۲)  $\frac{1}{2} \times 2^{-4}$

(۳)  $2^{-5} \times 2^{-5}$

(۴)  $\frac{1}{2} \times 2^{-6}$

- ۱۸ برای تعیین تقریبی از کوچک ترین ریشه مثبت معادله  $x = \tan(\frac{\pi}{2}x)$  به روش تکرار ساده، یعنی  $x_{n+1} = g(x_n)$  گزینه مناسب برای  $g(x)$  کدام است؟

(۱)  $g(x) = \frac{\pi}{\pi} \text{Arc tan } x$

(۲)  $g(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{\pi} \text{Arc tan } x$

(۳)  $g(x) = \pi + \text{Arc tan } x$

(۴)  $g(x) = -\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{\pi} \text{Arc tan } x$

- ۱۹ تقریب تابع  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$  در بازه هی  $I = [16, 17]$  با قطعه های درون یاب خطی مدنظر است. بازه هی  $I$  دست کم به چند

قطعه مساوی تقسیم شود تا کران بالای خطای درون یابی برای تخمین  $f(x)$  در سرتاسر بازه بیش از  $3 \times 2^{-3}$  نباشد؟

(۱) ۳۰

(۲) ۱۰۰۰

(۳) ۱۰۲۴

(۴) ۲۰۴۸

- ۲۰ فرض کنید  $(a_1, a_2, a_3)$  سه تابی  $\frac{3x^2 + x + 1}{x^3 - 6x^2 + 11x - 6}$  کدام است؟

(۱)  $(\frac{5}{2}, -15, \frac{31}{2})$

(۲)  $(\frac{5}{3}, 15, \frac{31}{3})$

(۳)  $(\frac{5}{2}, 15, \frac{31}{2})$

(۴)  $(\frac{5}{3}, -15, \frac{31}{2})$

- ۲۱- اگر  $p(x) = \sin \frac{\pi x}{2}$  چندجمله‌ای درونیاب تابع  $f(x) = \sin \frac{\pi x}{2}$  در نقاط ۰، ۱ و ۲ از بازه  $[0, 2]$  باشد، آنگاه کران بالا برای مقدار  $|f(x) - p(x)|$  در بازه  $[0, 2]$  برابر است با

$$\frac{\pi^3}{72} \quad (1)$$

$$\frac{\pi^3}{108} \quad (2)$$

$$\frac{\pi^3 \sqrt{3}}{216} \quad (3)$$

$$\frac{\pi^3 \sqrt{3}}{72} \quad (4)$$

- ۲۲- مرتبه همگرایی (مجانبی) روش تکراری نیوتن برای تعیین مینیمم تابع  $f(x) = (x-1)^4(x^2+1)-1$  برابر است با

(۱) یک

(۲) دو

(۳) سه

(۴) چهار

- ۲۳- رابطه تکراری زیر را برای پیدا کردن مینیمم کننده تابع  $f(x)$  به صورت زیر در نظر بگیرید:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f'(x_n)}{q(x_n)}$$

فرض کنید دنباله  $\{x_n\}$  به یک نقطه  $x^*$  همگرایست و می‌دانیم  $f'(x^*) = 0$ . چه رابطه‌ای بین  $f$  و  $q$  برقرار باشد تا نرخ همگرایی دست‌کم برابر با ۲ باشد؟

$$q'(x^*) = f'(x^*) \quad (1)$$

$$q'(x^*) = f''(x^*) \quad (2)$$

$$q''(x^*) = f'(x^*) \quad (3)$$

$$q''(x^*) = f(x^*) \quad (4)$$

- ۲۴- فرض کنید  $x \in \mathbb{R}^n$  و  $A_{n \times n}$  ماتریسی وارون پذیر است. گزینه صحیح برای یک نرم برداری کدام است؟

$$x^t Ax \quad (1)$$

$$x^t A^t x \quad (2)$$

$$\sqrt{x^t Ax} \quad (3)$$

$$\|Ax\|_2 \quad (4)$$

- ۲۵ - مسئله  $\min_{\lambda} \| b\lambda - c \|_2$  را در نظر بگیرید، که در آن  $b, c \in \mathbb{R}^n$  داده شده اند و  $\lambda \in \mathbb{R}$  مجهول است.

مقدار مینیمم گننده  $\lambda$  ..... .

(۱) برابر است با صفر اگر  $b$  و  $c$  متعامد باشند

(۲) یگانه است اگر و تنها اگر  $c = 0$

(۳) برابر است با صفر اگر  $b = \alpha c$  به ازای برخی  $\alpha \in \mathbb{R}$

(۴) همواره نا صفر است

- ۲۶ - فرض کنید:  $y'(x) \approx \frac{y(x+h) - y(x-h)}{2h} = F(h)$

می دانیم که  $F(h) - y'(x) = O(h^4)$ . کدام تقریب برای  $y'(x)$  دارای خطای  $O(h^4)$  است؟

$$\frac{F(\frac{h}{2}) - F(-\frac{h}{2})}{h} \quad (1)$$

$$\frac{F(\frac{h}{2}) - F(h)}{\frac{h}{2}} \quad (2)$$

$$\frac{F(\frac{h}{2}) + F(-\frac{h}{2})}{h} \quad (3)$$

$$\frac{F(\frac{h}{2}) + F(h)}{h} \quad (4)$$

- ۲۷ - می خواهیم تخمینی از  $\int_0^2 f(x)dx$  را با استفاده از جمع دو قاعده سیمسون ساده یکی روی بازه  $[0, 1]$  و دیگری روی بازه  $[1, 2]$  به دست آوریم. با استفاده از مقادیر در جدول زیر، مقدار این تخمین سیمسون مرکب برای انتگرال

چقدر است؟

$x$	۰	۰,۲۵	۰,۵	۰,۷۵	۱	۱,۵	۲	$\frac{3}{5}$ (۱)
$f(x)$	۰	۱/۵	۲	۲/۵	۳	۴	۴/۵	$\frac{4}{5}$ (۲)

$x$	۰	۰,۲۵	۰,۵	۰,۷۵	۱	۱,۵	۲	$\frac{5}{5}$ (۳)
$f(x)$	۰	۱/۵	۲	۲/۵	۳	۴	۴/۵	$\frac{5}{7.5}$ (۴)

- ۲۸ - می خواهیم قاعده زیر برای چندجمله ای های با حداقل درجه، به جای تابع  $f$ ، دقیق باشد. گزینه صحیح برای مقادیر  $a$  و  $b$  کدام است؟

$$\int_0^\pi \sin x \ f(x)dx = af(0) + bf'(\pi)$$

$$a = b = 1 \quad (1)$$

$$a = \pi, b = \pi \quad (2)$$

$$a = 1 - \pi, b = 1 + \pi \quad (3)$$

$$a = \pi, b = 1 - \pi \quad (4)$$

- ۲۹- روش انتگرال گیری به صورت  $\int_{\circ}^1 \frac{1}{\sqrt{x}} f(x) dx \approx W_1 [f(\sqrt{a}) + f(\sqrt{b})]$  مدنظر است. مقادیر  $W_1$ ,  $a$  و  $b$  چقدر

باشند تا این روش برای توابع خطی دقیق باشد؟

$$b = \frac{4}{9}, a = \circ, W_1 = 1 \quad (1)$$

$$a = b = \frac{2}{3}, W_1 = 1 \quad (2)$$

$$a = b = \frac{1}{3}, W_1 = 2 \quad (3)$$

$$b = 1, a = \circ, W_1 = 2 \quad (4)$$

- ۳۰- روش های تخمین انتگرال نقطه میانی، ذوزنقه ای و سیمsson را روی یک بازه  $[a, b]$  به ترتیب با  $M$ ,  $T$ ,  $S$  نشان دهید. در این صورت،  $S$  برابر است با ...

$$\frac{1}{3}(T+M) \quad (1)$$

$$\frac{2}{3}(T+M) \quad (2)$$

$$\frac{1}{3}T + \frac{2}{3}M \quad (3)$$

$$\frac{1}{6}T + \frac{2}{3}M \quad (4)$$

#### مبانی ماتریس ها و جبر خطی:

- ۳۱- بعد زیر فضای تولید شده توسط کدام است؟

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

- ۳۲- فرض کنید  $U$  و  $V$  دو زیر فضای برداری چهار بعدی متمایز از  $\mathbb{R}^4$  باشند. بعد  $U \cap V$  برابر با کدام یک از اعداد زیر است؟

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

- ۳۳ - کدام گزینه شرط وجود جواب برای دستگاه معادلات خطی است؟

$$\begin{bmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 6 & 2 & 2 \\ 0 & 5 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

$b = 2a + c$  (۱)

$b = 2a - c$  (۲)

$b = 2(c - a)$  (۳)

$b = 2(a + c)$  (۴)

- ۳۴ - اگر  $T: V \rightarrow V$  یک تبدیل خطی روی فضای برداری  $n$  بعدی  $V$  روی میدان  $\mathbb{F}$  با مشخصه ۲ باشد، به طوری که  $T^T = I$  قرار دهد  $\{v \in V \mid T(v) = v\}$  چه می‌توان گفت؟

$\dim W \geq \frac{n}{2}$  (۱)

$\dim W < \frac{n}{2}$  (۲)

$\dim W = n - 1$  (۳)

$\dim W = n$  (۴)

- ۳۵ - دترمینان ماتریس مقابل کدام است؟

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

-۳۰ (۱)

۰ (۲)

۳۰ (۳)

-۴۸ (۴)

- ۳۶ - فرض کنید  $W$  زیر فضایی از ماتریس‌های  $n \times n$  باشد که اعضای آن متقارن هستند، و چندجمله‌ای ویژه آن‌ها به شکل  $x^n + a_{n-2}x^{n-2} + a_{n-4}x^{n-4} + \dots + a_0x + a_0$  در این صورت بعد  $W$  روی  $\mathbb{R}$  کدام است؟

$\frac{(n-1)^2}{4}$  (۱)

$\frac{n(n+2)}{4}$  (۲)

$\frac{n(n-1)}{2}$  (۳)

$\frac{(n-1)(n+2)}{2}$  (۴)

- ۳۷ فرض کنید  $V = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$  یک فضای برداری روی  $\mathbb{Z}_2$  باشد و  $W$  زیر فضایی از  $V$  است. تعريف می کنیم  
به ازای هر  $(a, b) \in V$   $aa' + bb' = 0$  و  $(a', b') \in W$ . کدام گزاره صحیح است؟

(۱)  $W \cap W' = \{0\}$ (۲)  $\dim_{\mathbb{Z}_2} W + \dim_{\mathbb{Z}_2} W' = 2$ (۳)  $W'$  زیر فضایی از  $V$  نمی باشد.(۴) به ازای هر زیر فضای  $W$  از  $V$  داریم،  $W \neq W'$ 

- ۳۸ ماتریس  $X$  را خود توان گوییم هرگاه  $X^T = X$ . فرض کنید  $A$  و  $B$  دو ماتریس حقیقی  $n \times n$  باشند به طوری که  $A + B$  و  $B$  خود توان هستند. آنگاه:

(۱)  $\text{tr}(AB) = 0$ (۲)  $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$ 

(۳) خود توان است.

(۴) خود توان است.

- ۳۹ فرض کنید  $V = \mathbb{R}[x]$  مجموعه چندجمله‌ای‌های با ضرایب حقیقی باشد و همجنین،  $W = \left\{ f(x) \in P_{1394}(x) \mid f(2) = 0 \right\}$ . چنانچه  $P_{1394}(x) = \left\{ f(x) \in V \mid \deg f(x) \leq 1394 \right\}$

برابر است با:  $\dim_{\mathbb{R}} W$ 

(۱) ۱۳۹۲

(۲) ۱۳۹۳

(۳) ۱۳۹۴

(۴) ۱۳۹۵

- ۴۰ فرض کنید  $U$  و  $V$  دو زیر فضای برداری غیرمشمول در همدیگر از  $\mathbb{R}^n$  باشند، در این صورت همه موارد زیر صحیح‌اند، به‌غیراز:  $A \Delta B$  تفاضل متقارن دو مجموعه  $A$  و  $B$  است.

(۱)  $\langle U \cup V \rangle = U + V$ (۲)  $\langle U \cap V \rangle = U \cap V$ (۳)  $\langle U \Delta V \rangle = U \Delta V$ (۴)  $\langle U \setminus V \rangle = U$ 

- ۴۱ فرض کنید  $\mathbb{R}^+$  مجموعه تمام اعداد حقیقی مثبت باشد. برای هر  $x, y \in \mathbb{R}^+$  تعريف کنید  $x+y = xy$  و برای هر  $r \in \mathbb{R}$  و هر  $x \in \mathbb{R}^+$  تعريف کنید  $x^r = r^r x^r$ ، در این صورت کدام گزینه صحیح است؟

(۱) روی  $\mathbb{R}^+$  یک فضای برداری از بعد ۱ است.(۲) روی  $\mathbb{R}^+$  یک فضای برداری نیست.(۳) روی  $\mathbb{R}^+$  یک فضای برداری ۲ بعدی است.(۴) روی  $\mathbb{R}^+$  یک فضای برداری از بعد نامتناهی است.

-۴۲ اگر  $A^T = A$  و  $A \in M_n(\mathbb{C})$  در این صورت کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟

$$\text{rank}(A) = \text{tr}(A^T) \quad (1)$$

$$(\text{tr}A)^T = (\text{tr}A^T)^T \quad (2)$$

$$(\text{tr}A^T)^T = (\text{tr}A^T)^T \quad (3)$$

$$\text{rank}(A^T) = \text{tr}(A^T) \quad (4)$$

-۴۳ فرض کنید  $A$  یک ماتریس حقیقی  $7 \times 7$  باشد و  $\text{tr}(A) = 8$ . اگر  $A^T = 5A^T - 6A$  آنگاه رتبه  $A$  برابر است با:

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

۵ (۵)

-۴۴ فرض کنید  $A$  ماتریسی  $10 \times 10$  باشد که عناصر روی قطر آن ۱ است و بقیه در آیه های آن ۱ هستند. در این صورت

مجموع در آیه های وارون  $A$  برابر است با:

$$\frac{-3}{2} \quad (1)$$

$$-1 \quad (2)$$

$$\frac{-5}{4} \quad (3)$$

$$\frac{-3}{4} \quad (4)$$

$A = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & -4 \\ 4 & 1 & \sqrt{5} \\ -\sqrt{2} & 3 & 1 \\ 13 & 97 & \sqrt{3} \\ 1394 & 1395 & 1396 & 1397 \end{pmatrix}$  در این صورت داریم: فرض کنید -۴۵

(۱) وارون ناپذیر و ۱ مقدار ویژه آن می باشد.

(۲) وارون پذیر است و ۱ مقدار ویژه آن می باشد.

(۳) وارون ناپذیر است و ۱ مقدار ویژه آن نمی باشد.


(۴) وارون پذیر است و ۱ مقدار ویژه آن نمی باشد.

به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری سال ۱۳۹۵ می رساند، در صورت تمایل می توانید حداکثر تا تاریخ ۹۴/۱۲/۲۴ با مراجعه به [سیستم پاسخگویی اینترنتی](#)، نسبت به تکمیل فرم «اعتراض به کلید سوالات آزمون» اقدام نمایید. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طریق سامانه پاسخگویی اینترنتی و فرم مذکور دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طرق دیگر و بس از تاریخ اعلام شده، به هیچ عنوان رسیدگی نخواهد شد.



عنوان دفترچه	نوع دفترچه	شماره باسختامه	گروه امتحانی
علوم ریاضی	B	1	علوم پایه

شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
1	2	31	2
2	3	32	3
3	3	33	4
4	1	34	1
5	4	35	4
6	2	36	4
7	4	37	2
8	1	38	1
9	4	39	3
10	3	40	3
11	3	41	1
12	2	42	2
13	2	43	2
14	3	44	3
15	1	45	4
16	3		
17	4		
18	2		
19	3		
20	1		
21	3		
22	1		
23	2		
24	4		
25	1		
26	2		
27	4		
28	2		
29	1		
30	3		



# وبسایت تخصصی آزمون های زبان

## FastZaban.com

خروج

وبسایت تخصصی آزمون های زبان  
[www.FastZaban.com](http://www.FastZaban.com)

دانلود منابع آزمون های  
MSRT, EPT, MHLE, TOEFL

و دکتری همه رشته ها  
فروش اینترنتی کتاب های تألیفی استاد  
مهرداد زنگیه وندی

### Fast Grammar

توضیح کامل ۶۰ مهارت لاتگمن

به همراه سوالات آزمون های سراسری و آزمون های کتاب **Kit** با  
پاسخ کاملاً تشریحی

### Fast Reading

توضیح نکات و مهارت های درک مطلب آزمون

**Fast Grammar**

## گرامر جامع آزمون های زبان

- تافل دکتری
- آزمون دکتری همه رشته ها
- کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مجموعه زبان انتلیسی

✓ تشریح و توضیح کامل مهارت های ۶۰ گانه کتاب تافل لانگمن  
✓ آزمون های جامع و تست های کتاب Kit با پاسخ تشریحی  
✓ تست های طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی  
✓ تست های کنکور دکتری ۹۳ تا ۱۵ همه رشته ها با پاسخ تشریحی  
✓ شامل بیش از ۶۰۰۰ تست با پاسخ تشریحی



به همراه  
آموزش تکنیک های  
تست زنی

مؤلف: مهرداد زنگیه وندی

**www.FastZaban.com**

**وبسایت تخصصی آزمون های زبان**